Grupo Hospitalar Conceição

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

ODONTÓLOGO (ODONTOLOGIA HOSPITALAR)
61 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
   - contém 50 (cinquenta) questões;
   - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

BONSUCESSO CONCEIÇÃO

Controle de QUALIDADE Fundatec
Eco Friendly
A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.
Concursos Fundatec ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

LÍNGUA PORTUGUESA

A arte de ver o outro

Por Gilmar Marcílio

Estamos perdendo consideravelmente a capacidade de estabelecer relações de acolhimento e amor. Acho triste, pois precisamos desses dois sentimentos para abraçar com a alma aquele que está próximo de nós. Porém, há algo ainda a ser feito para sustentar esses pilares emocionais. Chegamos até aqui pela persistência em colaborar. E nessa palavra está embutido um longo trajeto de renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar. Talvez você se pergunte: como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si mesmas? Acredito ser um sintoma temporário: creio que vamos nos exaurir de tanta individualidade. A história é pendular. Ora aqui, ora acolá. Só após, o equilíbrio, também provisório.

Ninguém é autossuficiente o bastante para pre....indir de uma rede de apoio. Qualquer existência está intrinsecamente ligada ___ demais. A ruptura desses elos pode significar o nosso fim como espécie. No entanto, vejo sinais alentadores. Há muitos movimentos de solidariedade, largos gestos promovendo a salvação quando somos atingidos por uma tragédia ambiental, por exemplo. É comovente acompanhar tanta gente mobilizando-se em busca de uma solução ao se depararem com comunidades que passaram por grandes perdas. Dá-se a isso o nome de empatia.

Penso na magnífica arte da conversação. Vêm-me ___ mente os diálogos socráticos, nos quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista e é acolhido pelo grupo ___ despeito de eventuais divergências. Investigar diversas visões de mundo é multiplicar as experiências, pois nos deslocamos para um local (imaginário) diferente do nosso. O narcísico não gosta dessa prática e exatamente por isso deve-se insistir nesse propósito. Como é possível fazê-lo com eficiência? Depois das triviais perguntas "olá, tudo bem, como está?", nos despirmos um pouco da autorreferência. É o início de ricos encontros que geralmente desaguam em divagações filosóficas, transcendendo a banalidade do dia a dia. A inteligência é altamente sedutora, compete com os atrativos físicos. E há o fato de, com a passagem do tempo e o aprofundamento dos contatos, sempre termos o que acrescentar no diálogo com o amigo, o colega, o vizinho. Ver com paixão quem está ao lado é estabelecer uma ligação próxima ao princípio religioso de unicidade.

Conta-se que certas tribos indígenas, conhecidas por suas admiráveis criações artísticas, nunca assinam as peças produzidas. Para eles, a glória particular não tem valor algum. Visando escapar de tal armadilha da vaidade assinam as obras uns dos outros. Há neste pacto uma indizível beleza.

Veja para além dos olhos, com o corpo todo. Só assim será capaz de fazer a leitura correta de cada ser.

(Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/colunistas/gilmar-marcilio/noticia/2025/05/a-arte-de-ver-o-outro-cmazumqi900dq013bffhx3xa1.html – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

I. Para o autor, a tendência é que as pessoas fiquem cada vez mais egoístas, o que aponta para um futuro cada vez mais individualista.
II. Segundo o autor, um dos pilares que sustenta a nossa existência é o fato de termos nossas vidas interconectadas com as de outros indivíduos.
III. Considerando a totalidade do texto, é possível inferir que uma forma de melhor perceber o outro é investir em interações genuinamente interessadas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Analise a charge a seguir e as asserções a respeito da sua relação com o texto-base desta prova:



Fonte: Sul 21 (2015).

Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. Tanto o texto-base quanto a charge abordam o tema do individualismo.

ALÉM DISSO

II. Os dois textos apontam apenas cenários negativos a partir do individualismo, indicando uma sociedade sem recuperação.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é um complemento correto da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é um complemento correto da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 10, 16 e 17.

A) às – à – a
B) às – a – à
C) às – à – à
D) as – a – à
E) as – à – a

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego das figuras de linguagem, em qual dos trechos a seguir, retirados do texto-base, NÃO há a ocorrência de linguagem figurada?

A) "[...] abraçar com a alma aquele que está próximo de nós".
B) "Depois das triviais perguntas 'olá, tudo bem, como está?'".
C) "[...] nos despirmos um pouco da autorreferência".
D) "[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações filosóficas".
E) "Visando escapar de tal armadilha da vaidade".

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta palavra que NÃO poderia substituir corretamente o vocábulo "triviais" (l. 21) por causar alterações significativas ao sentido do trecho em que ele ocorre. Desconsidere eventuais alterações necessárias na estrutura da frase.

A) Tolas.
B) Corriqueiras.
C) Banais.
D) Simples.
E) Comuns.

QUESTÃO 06 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra "se" tenha sido empregada como conjunção.

A) "[...] renúncia ao egoístico ato de se colocar em primeiro lugar".
B) "Talvez você se pergunte [...]".
C) "[...] por isso deve-se insistir nesse propósito".
D) "[...] como será verdade se as pessoas estão cada vez mais pensando só em si".
E) "Conta-se que certas tribos indígenas [...]".

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações seriam obrigatoriamente necessárias caso a palavra "diálogos" fosse substituída por sua forma singular no trecho a seguir, retirado do texto-base:

"Vêm-me ___ mente os diálogos socráticos, nos quais cada interlocutor apresenta seus pontos de vista".

A) 3.
B) 4.
C) 5.
D) 6.
E) 7.

QUESTÃO 08 – Considerando a expressão "pre....indir de" (l. 09) na situação em que ocorre no texto, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Um sinônimo possível para tal expressão seria "dispensar".
B) A lacuna pontilhada deveria ser preenchida por "c".
C) A expressão é formada por um verbo da terceira conjugação.
D) Em relação à sua transitividade, tal verbo é transitivo indireto.
E) A forma verbal que compõe a expressão encontra-se no infinitivo.

QUESTÃO 09 – Na linha 11, tem-se o emprego da locução conjuntiva "No entanto", que carrega a ideia de _____ e poderia ser substituída por "_____", _____ necessárias alterações no período a fim de que se mantenha a mesma relação de sentido e a correção gramatical.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) condição – conquanto – sendo
B) condição – conquanto – não sendo
C) oposição – conquanto – sendo
D) oposição – todavia – não sendo
E) oposição – todavia – sendo

QUESTÃO 10 – Considerando os trechos a seguir, retirados do texto-base, assinale a alternativa na qual a palavra "que" NÃO tenha sido empregada como pronome relativo.

A) "[...] aquele que está próximo de nós".
B) "[...] com comunidades que passaram por grandes perdas".
C) "[...] ricos encontros que geralmente desaguam em divagações [...]".
D) "[...] sempre termos o que acrescentar no diálogo [...]".
E) "Conta-se que certas tribos indígenas [...]".

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 12 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 13 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

A) Clínica ampliada.
B) Acolhimento.
C) Cogestão.
D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 14 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 15 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

QUESTÃO 16 – O Estatuto do Idoso (Lei nº 10.763/2003) completa 22 anos em 2025, consolidando-se como um marco fundamental na proteção dos direitos da pessoa idosa no Brasil. Em relação a esse tema, assinale a alternativa correta.

A) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
B) Em caso da identificação de doenças infectocontagiosas em pessoa idosa na instituição de longa permanência, a instituição deverá comunicar ao Conselho da Pessoa Idosa para as devidas providências.
C) Entre as obrigações das instituições de longa permanência estão: preservar vínculos familiares, oferecer acomodações apropriadas para pessoa idosa e para o recebimento de visitas, promover atividades de lazer. Contudo, as instituições não são obrigadas a propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças.
D) Quando for necessário o comparecimento da pessoa idosa enferma perante os órgãos públicos, o agente promoverá o contato necessário com a família ou responsável para providenciar o deslocamento da pessoa até o órgão público demandante, com atendimento agendado prioritário.
E) A pessoa idosa enferma que necessitar de atendimento domiciliar para expedição do laudo de saúde necessário ao exercício de seus direitos sociais e de isenção tributária poderá realizar o atendimento em instituição privada não vinculada ao SUS e, posteriormente, encaminhar o laudo para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) através de procurador legalmente constituído.

QUESTÃO 17 – Para implementar o objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) de promover a saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação nas instituições e serviços do SUS, é necessário refletir sobre conceitos que dão base aos entendimentos sobre o assunto. Dessa forma, assinale alternativa que descreve corretamente o conceito de "racismo", de acordo com a cartilha "Educando para as Relações Étnico-Raciais" (2024).

A) Comportamento social originado do preconceito, que diferencia e classifica negativamente uma pessoa em função de alguma característica aparentemente diferente ou "específica".
B) Conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos necessários sobre determinado assunto. Acontece quando um julgamento antecipado inviabiliza o respeito às diferenças.
C) Forma sistêmica de discriminação baseada em raça/cor e etnia, que tem como resultado a desigualdade e a restrição de direitos nas esferas (pública e privada) da vida de pessoas não brancas, sendo construído e reproduzido a partir de relações de poder e dominação.
D) Falas e expressões que por vezes passam desapercebidos, pois parece que eles "sempre estiveram ali". Isso porque se baseiam em toda uma bagagem de aprendizados coletivos e vivências pessoais, em estereótipos raciais naturalizados com o tempo e que se materializam.
E) Compreensão de que é necessário oferecer condições adequadas para que todas as pessoas tenham, realmente, acesso às mesmas oportunidades. Isso significa dar mais para quem precisa mais, de forma proporcional e adequada às suas circunstâncias.

QUESTÃO 18 – Considerando a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, instituída pela Portaria nº 2.836/2011, assinale a alternativa correta.

A) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero, embora relacionadas, não incidem na determinação social da saúde.
B) Devido à inexistência de dados, ainda não é possível identificar se há ou não desigualdade de acesso aos serviços de saúde pelas lésbicas e mulheres bissexuais.
C) Uma das diretrizes na elaboração de planos, projetos e ações na saúde envolve a inclusão da temática da orientação sexual e identidade de gênero nos processos de educação permanente desenvolvidos para trabalhadores da saúde pelo SUS, não incluindo os integrantes dos Conselhos de Saúde e as lideranças sociais, que são abarcados pelo controle social.
D) A discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incidem no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais.
E) Há uma incoerência e desalinhamento entre a interseccionalidade e a produção da desigualdade no atendimento das demandas e necessidades em saúde da população LGBT, principalmente por conta da inclusão das especificidades de raça, cor, etnia, territoriais e outras congêneres na mesma população.

QUESTÃO 19 – Uma das diretrizes do Programa Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Valorização das Trabalhadoras no SUS é o acolhimento às trabalhadoras da saúde no processo de maternagem. São ações previstas nessa diretriz:

I. Sensibilizar as gestoras e os gestores para manutenção da carga horária e ampliação de metas de trabalho no primeiro mês após o retorno da licença-maternidade, visando à readaptação da mulher no trabalho na saúde.
II. Flexibilizar horários de trabalho garantindo dois descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho até o 6º mês de vida do bebê, além dos intervalos normais para repouso e alimentação, mesmo tratamento estendido para casos de adoção (art. 396 da CLT).
III. Fomentar estratégias de acolhimento e respeito às particularidades das mulheres que retornam do processo de licença maternidade e necessitam de reorganização do seu processo de trabalho.
IV. Flexibilizar horários de trabalho para mulheres lactantes trabalhadoras que retornam da licença-maternidade e desejam continuar amamentando seus filhos, para que possam sair para amamentar, visto ser vedado amamentar dentro da instituição de trabalho.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20 – Em relação às ações estratégicas da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Pessoa com Deficiência (PNAISPD) e Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência (RCPD) no âmbito do SUS, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Atendimento especializado em reabilitação e dispensação de tecnologia assistiva, aumentando as possibilidades de autonomia, independência e inclusão social da pessoa com deficiência.
B) Instituição de linhas de cuidado, informadas por evidências científicas, voltadas às pessoas com deficiência, entre elas, mas não restrita, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), pé torto congênito, trissomia do cromossomo 21, pessoas estomizadas e outras condições de saúde, considerando a lógica de atenção interprofissional, multiprofissional e interdisciplinar.
C) Definição de fluxos para o acesso à tecnologia assistiva de acordo com critérios de equidade e funcionalidade, incluindo medicamentos, órteses, próteses e meios auxiliares de locomoção.
D) Ampliação e fortalecimento das ações voltadas ao diagnóstico precoce de agravos, incluindo-se as triagens neonatais, de modo a possibilitar intervenções precoces e início do tratamento, habilitação e/ou reabilitação em tempo oportuno.
E) Articulação e integração dos diferentes pontos de atenção, considerando a centralidade da Atenção Especializada como coordenadora do cuidado e ordenadora das Redes de Atenção à Saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21 – Em relação à publicidade profissional na Odontologia, conforme as normas éticas vigentes, é permitido ao cirurgião-dentista:

A) Garantir resultados de tratamentos em redes sociais.
B) Divulgar fotos de "antes e depois", desde que não haja identificação do paciente.
C) Fazer referência à excelência de sua formação e atuação em áreas específicas.
D) Apresentar o número de registro no Conselho Regional de Odontologia (CRO) em materiais de divulgação.
E) Mencionar premiações recebidas como forma de valorização de sua atuação profissional.

QUESTÃO 22 – Em relação ao processo de trabalho na Estratégia de Saúde da Família (ESF), analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) A adscrição de clientela permite identificar a população sob responsabilidade da equipe, favorecendo o vínculo, a continuidade do cuidado e a responsabilização sanitária.
( ) A organização do processo de trabalho deve priorizar o atendimento da demanda espontânea, mesmo que em detrimento das ações programadas e da vigilância em saúde.
( ) A responsabilização sanitária implica compromisso longitudinal da equipe com os agravos e condições de saúde da população sob sua responsabilidade.
( ) O planejamento das ações da equipe deve ocorrer exclusivamente em nível municipal, sendo responsabilidade da gestão central definir metas e rotinas do processo de trabalho das unidades.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – F.
B) V – V – F – F.
C) F – F – V – V.
D) F – V – F – F.
E) V – F – V – V.

QUESTÃO 23 – Antônio, 59 anos, vive em situação de vulnerabilidade social e é acompanhado pela equipe da ESF. Possui diabetes descompensado, é edêntulo total e relata dificuldade de alimentação por ausência de prótese. A Equipe de Saúde Bucal (ESB) realiza avaliação e deseja inseri-lo no fluxo de reabilitação, conforme diretrizes da Política Nacional de Saúde Bucal (PNSB). Sobre esse caso, analise as assertivas abaixo:

I. A inclusão do paciente em fluxo de prótese dentária pode ser feita pela própria ESB, com moldagem inicial e solicitação ao Laboratório Regional de Prótese Dentária, conforme protocolos locais.
II. Pacientes em situação de vulnerabilidade têm prioridade absoluta no processo de confecção de prótese, independentemente da avaliação clínica.
III. A ESB deve atuar em parceria com outros profissionais da unidade para garantir a abordagem integral, incluindo controle glicêmico e orientação nutricional.
IV. A confecção de prótese total pelo SUS depende de encaminhamento exclusivo ao Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), pois não é atribuição da Atenção Primária/Básica.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e III.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 24 – Durante a anamnese, um paciente adulto relata uso contínuo de losartana e omeprazol, além de episódios recorrentes de dor epigástrica. Está agendada uma exodontia do dente 38 incluso. Com base na farmacologia dos Anti-inflamatórios Não Esteroidais (AINEs) e nas boas práticas clínicas em Odontologia, assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação relativa ao uso de AINEs nesse cenário.

A) Paciente com hipotireoidismo sob controle medicamentoso, sem queixas gastrointestinais ou cardiovasculares.
B) Paciente em uso regular de losartana e inibidor da bomba de prótons, com histórico de desconforto epigástrico.
C) Indivíduo ansioso, com uso esporádico de ansiolítico benzodiazepínico, sem disfunções orgânicas conhecidas.
D) Jovem de 17 anos, sem comorbidades registradas, com boa condição geral de saúde.
E) Indivíduo com histórico odontológico de cirurgia parendodôntica realizada no último ano, sem intercorrências pós-operatórias.

QUESTÃO 25 – Em pacientes com gengivite ulcerativa necrosante aguda, uma das principais indicações farmacológicas é:

A) Prednisona associada à clorexidina.
B) Dipirona 500 mg e ibuprofeno 600 mg, em doses alternadas, a cada 6 horas.
C) Metronidazol 400 mg, 3 vezes ao dia, 7 dias, associado a debridamento mecânico.
D) Nistatina suspensão oral, por 14 dias.
E) Cefalexina associada a fluconazol.

QUESTÃO 26 – Sobre o papel do cirurgião-dentista na equipe hospitalar e os aspectos éticos e clínicos da sua atuação em ambiente de alta complexidade, analise as assertivas abaixo:

I. O cirurgião-dentista deve adequar sua conduta às limitações clínicas do paciente crítico, priorizando a biossegurança e a estabilidade sistêmica.
II. A documentação em prontuário de todas as ações odontológicas no ambiente hospitalar é obrigatória, inclusive é passível de descredenciamento na dependência do Regimento Interno.
III. A intervenção odontológica em pacientes neutropênicos deve ser imediata, preferencialmente com raspagem e profilaxia.
IV. A atuação do dentista em ambiente hospitalar inclui não apenas o tratamento de lesões, mas também ações preventivas e de educação em saúde.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 27 – Sobre os vasoconstritores utilizados em anestésicos locais, é correto afirmar que:

A) A epinefrina aumenta o sangramento no campo operatório por efeito vasodilatador.
B) A felipressina é contraindicada em pacientes hipertensos, por seu efeito adrenérgico.
C) A presença de vasoconstritor aumenta a duração da anestesia e reduz toxicidade sistêmica.
D) A noradrenalina é mais segura que a epinefrina, por ter ação exclusivamente periférica.
E) A associação de anestésico sem vasoconstritor é preferível em todos os portadores de cardiopatias.

QUESTÃO 28 – No contexto da atuação odontológica em ambientes hospitalares, o controle rigoroso de infecções cruzadas é fundamental para a segurança do paciente e da equipe de saúde. Considerando os protocolos de biossegurança e as medidas de precaução padrão preconizadas para prevenção de infecções nosocomiais, assinale a alternativa correta.

A) A limpeza dos instrumentais críticos pode ser realizada manualmente, desde que eles sejam imersos em desinfetante de alto nível antes da esterilização.
B) O atendimento de pacientes com histórico de infecções transmissíveis deve ser programado sempre para o final do expediente para evitar risco de contaminação da unidade odontológica.
C) O uso de antisséptico bucal pré-procedimento é indicado apenas em pacientes com sinais clínicos de inflamação gengival ativa ou sangramento.
D) A esterilização de sondas e espelhos é obrigatória apenas quando usados em procedimentos cirúrgicos ou em ambiente hospitalar de risco elevado.
E) A utilização de campos, barreiras plásticas em superfícies de contato e Equipamento de Proteção Individual (EPI) são medidas universais aplicáveis a todos os atendimentos, independentemente do diagnóstico do paciente.

QUESTÃO 29 – Durante a exodontia do dente 26 (primeiro molar superior esquerdo), um paciente adulto, hígido, sem histórico de doenças sistêmicas ou uso de anticoagulantes, apresenta sangramento abundante e persistente no alvéolo, mesmo após irrigação e compressão inicial com gaze estéril. Não há sinais de hemorragia sistêmica ou comprometimento geral, e a extração foi tecnicamente correta. Considerando a situação descrita e com base em evidências científicas, qual é a conduta clínica local mais adequada para esse caso?

A) Suspender o atendimento, solicitar exames laboratoriais de coagulação e encaminhar o paciente para avaliação médica de urgência.
B) Prescrever antibiótico profilático e analgésico opioide para prevenir infecção e controlar a dor associada ao sangramento.
C) Aplicar compressão com gaze embebida em hemostático local, associar sutura alveolar se necessário e observar resposta clínica imediata.
D) Realizar nova anestesia local com maior concentração de vasoconstritor e aplicar gelo diretamente no alvéolo.
E) Considerar o sangramento como normal em molares superiores e apenas orientar o paciente a manter pressão com gaze por algumas horas em casa.

QUESTÃO 30 – Sobre o tratamento cirúrgico do cisto radicular residual, assinale a alternativa correta.

A) A exérese cirúrgica deve sempre incluir a remoção de tecidos duros adjacentes e margem óssea de 1 cm.
B) Cistos residuais assintomáticos e estáveis devem ser acompanhados clinicamente e não requerem biópsia.
C) Os cistos radiculares residuais apresentam alto risco de transformação maligna, justificando quimioterapia preventiva.
D) Em casos de cisto residual em mandíbula posterior, a marsupialização é preferida devido ao risco de fratura.
E) A abordagem padrão é a enucleação cirúrgica, com envio obrigatório da peça para exame histopatológico.

QUESTÃO 31 – Sobre Úlceras Aftosas Recorrentes (UAR), assinale a alternativa correta.

A) São lesões ulceradas, dolorosas, recobertas por pseudomembrana esbranquiçada, com halo eritematoso, e ocorrem exclusivamente em mucosa queratinizada.
B) A forma herpetiforme ocorre tipicamente em adultos jovens, com múltiplas lesões pequenas, muitas vezes confundidas com infecção herpética.
C) A forma major é a mais comum, autolimitada e geralmente não deixa cicatriz após a resolução.
D) O tratamento é exclusivamente com antivirais sistêmicos, independentemente da forma clínica.
E) São manifestações típicas da mucosite urêmica em pacientes com insuficiência renal crônica.

QUESTÃO 32 – De acordo com Peterson *et al*. (2016) sobre subluxação e trauma dentário em dentes permanentes, analise as assertivas abaixo:

I. A subluxação é uma lesão de ligamento periodontal sem perda da posição do dente, e raramente requer tratamento além do controle da dor e acompanhamento pulpar.
II. Radiograficamente, a subluxação pode ser confirmada por um aumento visível no espaço do ligamento periodontal em um ou mais lados da raiz.
III. A resposta pulpar a uma subluxação pode variar, sendo comum o desenvolvimento de necrose pulpar em adultos, motivo pelo qual o teste de sensibilidade deve ser repetido periodicamente.
IV. O uso de antibióticos sistêmicos é indicado rotineiramente em todos os casos de subluxação para prevenir infecções endodônticas ou periodontais.

Quais estão corretas?

A) Apenas I, II e III.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 33 – Um paciente de 78 anos sofreu uma queda com impacto na região da mandíbula e apresenta dor à movimentação mandibular, limitação de abertura bucal e desvio da linha média para a direita. A tomografia revela fratura unilateral da cabeça do côndilo mandibular direito, sem desvio significativo e sem acometimento de estruturas intracranianas. O paciente é hígido, mas apresenta limitação funcional leve. Com base nos princípios descritos por Peterson *et al*. (2016) no manejo de fraturas condilares em adultos e considerando o perfil clínico do paciente, assinale a alternativa correta.

A) O tratamento cirúrgico com redução aberta e fixação interna é indicado para prevenir fibrose da articulação temporomandibular e garantir alinhamento ósseo.
B) O tratamento conservador com fisioterapia precoce, dieta pastosa e monitoramento funcional é apropriado, dada a ausência de deslocamento e a idade avançada.
C) O Bloqueio Maxilomandibular (BMM) é obrigatório em todas as fraturas condilares, inclusive em idosos, para garantir imobilidade e consolidação óssea.
D) Em pacientes acima de 70 anos, a exodontia dos dentes posteriores deve preceder qualquer abordagem da fratura condilar para evitar sobrecarga oclusal.
E) A cirurgia de acesso pré-auricular com osteossíntese é contraindicada apenas nos casos de fratura bilateral da cabeça condilar, mas indicada nas fraturas unilaterais.

QUESTÃO 34 – João, 59 anos, portador de Doença Renal Crônica (DRC) em estágio 4, com aproximadamente 30% da função renal (TFG estimada em 20 mL/min/1,73 m²), é acompanhado por nefrologista e faz uso de eritropoetina, carbonato de cálcio e furosemida. Compareceu ao pronto atendimento odontológico com dor intensa em região posterior superior esquerda, febre baixa e edema local. Ao exame, detecta-se abscesso agudo em região do dente 28, com trismo moderado. Relata que a última dosagem de creatinina foi de 6,2 mg/dL (0,7-1,3 mg/dL) e ureia de 158 mg/dL (10-50 mg/dL), com anemia normocítica com Hb = 9,4 g/dL (13,5-17,5 g/dL) e função plaquetária alterada (tempo de sangramento prolongado, plaquetas = 138.000/mm³ (150-400.000/mm^3). Com base nesse cenário e nos princípios da atenção odontológica em pacientes com DRC avançada, assinale a alternativa correta.

A) A incisão e drenagem devem ser realizadas imediatamente, com anestesia local convencional, e antibioticoterapia iniciada apenas se houver piora sistêmica.
B) A amoxicilina com ácido clavulânico é uma opção segura para o controle infeccioso inicial, sem necessidade de ajuste de dose, pois é eliminada por via hepática.
C) O uso de AINEs, como o ibuprofeno, é indicado para controle álgico, desde que associado à proteção gástrica.
D) A prescrição de analgésicos deve considerar o metabolismo e excreção renal; dipirona é preferível à morfina ou a AINEs nesse paciente.
E) Dado o risco de infecção em foco odontogênico, é indicada a extração imediata do dente 28, mesmo sem antibiótico profilático e tempo de sangramento alterado.

QUESTÃO 35 – Em relação aos cuidados odontológicos em pacientes imunocomprometidos internados em ambiente hospitalar, como Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) ou enfermarias de transplante, analise as assertivas abaixo:

I. O uso de clorexidina a 0,12% como antisséptico bucal é recomendado como medida preventiva auxiliar em pacientes imunossuprimidos, com evidência de redução do risco de pneumonia nosocomial.
II. Procedimentos odontológicos eletivos, como raspagens e profilaxias, devem ser evitados em fases ativas de quimioterapia ou mielossupressão intensa, mesmo com anestesia local.
III. O uso rigoroso de EPIs protege tanto a equipe quanto o paciente imunocomprometido, reduzindo o risco de infecção cruzada.
IV. A rastreabilidade dos ciclos de esterilização de instrumentais odontológicos é prática recomendada em odontologia hospitalar, sobretudo em setores com pacientes de alto risco imunológico.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I, II e IV.
C) Apenas I, III e IV.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 36 – Em relação à candidíase oral, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) A queilite angular caracteriza-se por lesões vermelhas, fissuradas e cruentas, geralmente presentes na comissura labial.
( ) A candidíase hiperplásica apresenta-se como placas brancas destacáveis, assintomáticas, geralmente presentes na mucosa jugal.
( ) A candidíase eritematosa geralmente causa sensação de queimação, com presença de máculas vermelhas, presentes na mucosa jugal, palato e dorso lingual.
( ) Placas brancas, com odor fétido, não destacáveis e presentes em mucosa jugal, palato e língua são normalmente apresentações da candidíase pseudomembranosa.
( ) A candidíase geralmente está associada ao estado imunológico do hospedeiro, ao meio ambiente da mucosa bucal e à resistência da *Candida albicans.*

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – V – V – F – V.
B) V – F – V – F – V.
C) V – F – V – V – V.
D) F – V – F – V – F.
E) V – F – F – F – F.

QUESTÃO 37 – A leucoplasia oral é definida pela Organização Mundial da Saúde como uma placa ou mancha branca que não pode ser caracterizada clinicamente ou patologicamente como qualquer outra doença. Qual das condições apresentadas a seguir geralmente pode ser associada à infecção pelo vírus HIV?

A) Líquen plano.
B) Leucoedema.
C) Candidíase hiperplásica.
D) Papiloma.
E) Leucoplasia pilosa.

QUESTÃO 38 – Sobre a angina de Ludwig, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Ocorre aumento edemaciado periorbitário, com envolvimento das pálpebras e conjuntiva.
B) Há tumefação no assoalho da boca, língua e região submandibular.
C) Sinais como disfagia, disfonia, sialorreia e disartria são evidenciados.
D) Tratamento com antibioticoterapia, drenagem cirúrgica e manutenção das vias aéreas são primordiais.
E) Penicilinas são a primeira escolha, podendo ser usadas clindamicina e cloranfenicol nos pacientes alérgicos à penicilina.

QUESTÃO 39 – Qual é a localização intraoral mais comum de aparecimento do carcinoma de células escamosas?

A) Mucosa jugal.
B) Gengiva.
C) Mucosa labial.
D) Língua.
E) Assoalho bucal.

QUESTÃO 40 – Síndrome que apresenta como sinais característicos a presença de costelas bífidas e alargadas e, frequentemente, múltiplos cistos nos ossos maxilares, sendo o ceratocisto odontogênico geralmente associado. A descrição apresentada refere-se à síndrome de

A) Gardner.
B) Behçet.
C) Gorlin.
D) Sjögren.
E) Peutz-Jeghers.

QUESTÃO 41 – Nas lesões ulcerativas presentes na cavidade oral, deve-se observar principalmente aspectos e sinais característicos de cada lesão. Sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta uma suspeita maior de carcinoma epidermoide.

A) Ulceração de mucosa, com centro necrótico amarelo-esbranquiçado e borda eritematosa dolorosa, às vezes apresenta linfadenopatia, podendo ser múltiplas lesões.
B) Ulceração indolor, com bordas elevadas e endurecidas, podendo estar associada a leucoplasia e áreas eritematosas, com ou sem sangramento. Pode apresentar linfadenopatia rígida. Normalmente, encontrada na língua, lábio inferior e assoalho bucal.
C) Múltiplas ulcerações rasas, dolorosas e usualmente em grupos, com centros e bordas eritematosas, podendo apresentar febre, gengivite, linfadenopatia e dificuldades na higienização.
D) Ulceração indolor, com centro esbranquiçado, com bordas elevadas, presença de linfadenopatia unilateral. Cicatriza espontaneamente em cerca de um mês, presente normalmente em lábio, língua e amígdalas.
E) Ulcerações grandes e destrutivas, afetando geralmente a gengiva inserida, com presença de pseudomembranas dolorosas, com perda de arquitetura local e necrose intensa.

QUESTÃO 42 – Sobre as condutas e orientações relativas ao tratamento dentário preventivo para pacientes que serão submetidos à radioterapia, analise as assertivas a seguir:

I. Instruir higiene bucal, com profilaxia, raspagem e polimento dentário. Orientar uma dieta pobre em sacarose, com prescrição de bochechos de fluoreto de sódio neutro.
II. Eliminar cáries ativas e todas as fontes de irritação intraoral, tais como cúspides fraturadas, próteses quebradas e mal adaptadas.
III. Eliminar dentes infectados, com doença periodontal e/ou apical, com cáries profundas.
IV. Adiar tratamentos eletivos, como próteses removíveis; o preparo de coroas com risco de comprometimento pulpar e implantes dentários devem ser executados o mais breve possível, a fim de agilizar o tratamento.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 43 – Em relação ao trauma de face, existem inúmeras regiões que podem ser afetadas, algumas de forma isolada, e outras podem apresentar múltiplas fraturas. A classificação que se caracteriza por apresentar uma disjunção craniofacial é fratura de(o)

A) arco zigomático.
B) tipo LeFort I.
C) tipo LeFort II.
D) tipo LeFort III.
E) mandíbula.

QUESTÃO 44 – Em relação ao cisto dentígero, assinale a alternativa INCORRETA.

A) É o tipo de cisto de inflamatório mais comum, englobando cerca de 20% dos cistos epiteliados dos maxilares.
B) Envolve a coroa de um dente incluso e está unido ao dente em sua junção amelocementária.
C) Embora os cistos dentígeros possam ser encontrados em pacientes de diferentes idades, são geralmente identificados em pacientes entre 10 e 30 anos de idade.
D) Lesões como ceratocistos, ameloblastoma unicístico e diversos outras lesões odontogênicas e não odontogênicas podem apresentar imagem radiográfica semelhante ao cisto dentígero, fazendo com que o exame histopatológico seja extremamente importante no diagnóstico.
E) Usualmente, o tratamento do cisto dentígero é a cuidadosa enucleação do cisto juntamente com a remoção do dente incluso associado. Se a erupção do dente envolvido for viável, pode-se considerar sua preservação.

QUESTÃO 45 – O tumor odontogênico de crescimento lento, de maior relevância em relação à sua frequência, oriundo do epitélio odontogênico, que apresenta aspecto radiográfico multilocular mais comum, semelhante a "bolhas de sabão" ou "favos de mel", e expansão das corticais lingual e bucal, podendo atingir grandes proporções, é comumente chamado de:

A) Tumor odontogênico epitelial calcificante.
B) Odontoma.
C) Ameloblastoma.
D) Fibroma ameloblástico.
E) Tumor odontogênico adenomatoide.

QUESTÃO 46 – Em relação à endocardite bacteriana, assinale a alternativa INCORRETA.

A) É uma infecção das válvulas cardíacas ou das superfícies endoteliais do coração.
B) Apresenta um índice de 10% de mortalidade, e a manipulação dentária é a única causa identificável de bacteremia transitória capaz de causar essa condição.
C) Qualquer manipulação dentária capaz de resultar em sangramento gengival pode causar bacteremia passageira.
D) As complicações relacionadas à endocardite são, por exemplo, abscessos no miocárdio, insuficiência cardíaca congestiva e incompetência valvular.
E) Pacientes com sopro inofensivo e funcionais não necessitam de profilaxia com antibióticos.

QUESTÃO 47 – O paciente cirúrgico necessita de atenção especial em sua avaliação pré-operatória. Exames laboratoriais são necessários para que se possa evidenciar situações de risco. Em relação aos distúrbios sanguíneos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A hemofilia A está relacionada à deficiência do fator IX de coagulação.
B) A deficiência na coagulação pode se dar devido a fatores congênitos, como as hemofilias, e a fatores adquiridos, como as induzidas por drogas anticoagulantes.
C) Exames laboratoriais básicos como a contagem de plaquetas, tempo de sangramento, tempo de protrombina e tromboplatina parcial ativada são de grande importância nessa avaliação.
D) Os médicos de pacientes que fazem uso de anticoagulantes devem sempre ser consultados previamente se houver a necessidade de suspensão do medicamento para executar algum procedimento.
E) A doença de von Willebrand se caracteriza por uma deficiência no fator VIII da cascata de coagulação associada a uma deficiência na função plaquetária.

QUESTÃO 48 – Em relação à pericoronarite, analise as assertivas a seguir:

I. A pericoronarite é uma infecção dos tecidos moles à volta de um dente parcialmente impactado.
II. É causada por estreptococos e uma grande variedade de bactérias anaeróbias, as quais habitam normalmente o sulco gengival.
III. Pode manifestar-se desde uma infecção leve até uma infecção grave que necessite de internação hospitalar.
IV. No caso de pacientes que já sofreram um episódio de pericoronarite tratado com sucesso de forma conservadora, deve-se considerar a remoção do terceiro molar responsável para evitar novas infecções.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas II e III.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 49 – Em relação à biossegurança e ao uso de EPIs, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) A vacina contra a hepatite B deve ser administrada em três doses (0, 1 e 6 meses).
( ) Em casos de acidente com material biológico na mão do profissional, o local da ferida ou da pele que foi exposto deve ser limpo abundantemente com álcool 70%.
( ) Os materiais perfurocortantes descartáveis devem ser colocados em recipientes de parede rígidos e apropriados para este fim.
( ) Quando houver um acidente com material biológico, deve-se notificar o serviço de controle de infecção hospitalar e encaminhar o profissional e o paciente para o local de referência mais próximo.
( ) A medicação profilática para HIV para o profissional acidentado deve ser iniciada em até 2 horas após decorrido o acidente, sendo orientada pelo médico infectologista responsável pelo caso.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – V – V – F – V.
B) V – F – V – F – F.
C) V – F – V – V – V.
D) F – V – F – V – F.
E) V – F – F – V – F.

QUESTÃO 50 – Em relação às doenças ósseas dos maxilares, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A osteonecrose relacionada aos bifosfonatos pode se manifestar apenas em pequenas áreas de exposição óssea indolor ou até em extensas áreas de sequestro ósseo com fístula.
B) Os bifosfonatos são medicamentos utilizados para tratamento do mieloma múltiplo, hipercalcemia maligna, doença de Paget, osteoporose juvenil idiopática, entre outras.
C) A osteonecrose é uma condição clínica caracterizada pela necrose do osso, resultante de fatores sistêmicos e locais que comprometem a vascularização óssea.
D) Em pacientes já em uso de bifosfonatos e que precisem realizar exodontia ou procedimento com manipulação de tecido ósseo, o risco é baseado principalmente na idade do paciente.
E) A administração dos bifosfonatos por via intravenosa parece estar associada a um expressivo número de casos de osteonecrose dos maxilares, e apenas uma pequena parcela dos casos é atribuída ao uso desses medicamentos por via oral.