Grupo Hospitalar Conceição

Domingo de manhã

CONCURSOS PÚBLICOS Nº 01 E 02/2025

MÉDICO (GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA)
94 – HOSPITAL FEDERAL BONSUCESSO (RJ)

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala e aguarde o 2º sinal sonoro para **abrir** este caderno de questões e **iniciar** a prova.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata exclusão do certame.
3. Após o 2º sinal, certifique-se de que este caderno de questões:
   - contém 40 (quarenta) questões;
   - **refere-se ao número e ao cargo para o qual realizou a inscrição.**
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de questões, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

BONSUCESSO CONCEIÇÃO

Controle de QUALIDADE Fundatec
Eco Friendly
A Fundatec utiliza papel com certificação florestal e tinta biodegradável.
Concursos Fundatec ISO 9001

RASCUNHO
Utilize esse espaço para anotar suas respostas

*A anotação neste rascunho NÃO substitui o preenchimento da grade de respostas.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

61	62	63	64	65	66	67	68	69	70

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80

81	82	83	84	85	86	87	88	89	90

91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – Considerando as previsões da Constituição Federal de 1988 em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta.

A) O subsistema da saúde está inserido no sistema social do seguro, em conjunto com os subsistemas da previdência social e assistência social.
B) Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
C) A participação na produção de medicamentos, equipamentos e imunobiológicos é de competência do SUS, com exceção da produção dos hemoderivados.
D) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde é de competência do Ministério da Educação, com apoio do Ministério da Saúde.
E) É de competência das Universidades todo desenvolvimento científico e tecnológico da área da saúde, não havendo necessidade de incremento pelo SUS.

QUESTÃO 02 – Considerando as previsões em relação ao SUS com base na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

A) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais.
B) A Lei regula, em todo o território nacional, as ações e serviços de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito privativamente público.
C) Os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização da Agência Nacional de Saúde (ANS).
D) O SUS poderá, em livre iniciativa e a qualquer momento, recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada, em detrimento da própria oferta de serviços, formalizadas mediante termo de compromisso entre as instituições.
E) Na prestação de serviços de assistência à saúde, serão observados os princípios éticos e as normas expedidas pelo órgão de direção do SUS quanto às condições para seu funcionamento, com exceção dos serviços prestados pela iniciativa privada, que possuem seu próprio regramento.

QUESTÃO 03 – Mesas de negociação, contratos internos de gestão, Câmara Técnica de Humanização (CTH), Grupo de Trabalho de Humanização (GTH), gerência de porta aberta, entre outros, são arranjos de trabalho que exemplificam dispositivos de qual diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH)?

A) Clínica ampliada.
B) Acolhimento.
C) Cogestão.
D) Valorização do trabalho e do trabalhador.
E) Defesa dos direitos do usuário.

QUESTÃO 04 – Não basta garantir o direito ao acompanhante, é preciso que existam espaços capazes de acolhê-los, assim como não é possível assegurar e promover a inclusão da pessoa com deficiência sem a configuração de espaços e de práticas de modo universalizante. Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A sensibilidade às necessidades é o primeiro passo para favorecer a inclusão dos diferentes sujeitos.
B) Um objeto acessível é aquele que pode ser alcançado para uso. Uma vez alcançado, supõe-se que seu uso, seguro e autônomo, não seja mais uma questão de acessibilidade, e sim de usabilidade.
C) A confortabilidade não se limita à supressão dos fatores indesejáveis e de inacessibilidade, mas envolve algo a mais, um conjunto de valores onde trabalhadores e usuários identifiquem seu mundo e suas referências nos espaços de cuidado e atenção à saúde.
D) Utilizar o conceito arquitetônico de Desenho Compartimental ao projetar os espaços da saúde, favorece a integração e potencializa o espaço para o uso democrático dos diferentes usuários.
E) A discussão compartilhada do projeto arquitetônico, das reformas e do uso dos espaços de acordo com as necessidades de usuários, acompanhantes e trabalhadores de cada serviço, possibilita a criação de espaços saudáveis e acolhedores e melhora o processo de trabalho e a produção de saúde.

QUESTÃO 05 – A qualidade da atenção à saúde exige a formação de pessoal específico, com domínio de tecnologias que qualifiquem a atenção individual e coletiva. É imprescindível e obrigatório o comprometimento das instituições de ensino em todos os níveis, com o SUS e com o modelo assistencial definido nas Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990. Esse comprometimento se dá por meio de diversas ações, como as seguintes, EXCETO:

A) Formulação de diretrizes curriculares que contemplem as prioridades expressas pelo perfil epidemiológico e demográfico das regiões do País.
B) Incentivo à formação dos trabalhadores do SUS, em todos os níveis, em especial nas áreas prioritárias para o funcionamento do Sistema, incluindo gestores, por meio das escolas de governo vinculadas às Secretarias Municipais e de Estado de Saúde, escolas técnicas federais e universidades da localidade ou de sua região.
C) Implementação de política de capacitação de docentes orientada para o SUS.
D) Abertura de campos de estágio para a formação dos trabalhadores do SUS, tendo o trabalho como referência e eixo central do processo ensino-aprendizagem, vinculados aos princípios e aos objetivos do SUS.
E) Incentivo aos programas de residência médica e em área profissional, adequados às necessidades da instituição de ensino e/ou estabelecimento de saúde proponente e deliberadas pelos respectivos Conselhos de Classe.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito da prevenção de doenças através de imunizações, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Imunização é o processo de indução de imunidade por meio da administração de antígenos (por exemplo, as vacinas) ou anticorpos.
B) Vacina inativada é aquela composta por bactérias ou vírus mortos que, após replicação em meios de cultura, são inativados por procedimentos químicos ou físicos.
C) Vacina combinada é uma vacina na qual o polissacarídeo é conjugado a uma proteína carreadora, com capacidade de estimular a reposta imune timo-dependente.
D) A vacina BCG é uma vacina atenuada composta por bactérias vivas, especialmente o bacilo de Calmette-Guérin que protege contra as formas graves de tuberculose, como a miliar e a meningite tuberculosa.
E) A vacina oral contra poliomielite é atenuada, composta por vírus vivos, e a vacina injetável contra poliomielite é inativada, composta por vírus mortos.

QUESTÃO 07 – Sobre os acidentes com escorpiões, que podem levar a pessoa acidentada a um quadro clínico emergencial, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Os escorpiões são de grande importância na saúde pública, especialmente em decorrência de fatores associados à urbanização desordenada, com acúmulo de resíduos, lixo, proliferação de pragas urbanas, e ao transporte de cargas.
B) A cauda dos escorpiões é formada por dois segmentos e no fim dela situa-se o ferrão, também conhecido como telso. São crescentes no Brasil os acidentes com escorpiões do gênero *Tityus (T. serrulatus* – escorpião preto).
C) Grupos vulneráveis são representados por sujeitos trabalhadores na construção civil, ou em madeireiras, distribuidoras de hortifrutigranjeiros, e crianças e pessoas que permanecem em casa ou em quintais por maiores períodos.
D) Os escorpiões podem sobreviver vários meses sem alimento e sem água.
E) O soro antiescorpiônico intravenoso é indicado para quadro grave com manifestação sistêmica intensa, como inúmeros episódios de vômitos, priapismo, convulsões, insuficiência cardíaca e agitação alternada com sonolência.

QUESTÃO 08 – A respeito de Epidemiologia em Saúde e/ou de indicadores de saúde que podem ser utilizados na avalição de serviços de saúde ou da situação de saúde na população, assinale a alternativa INCORRETA.

A) A avaliação dos serviços de saúde é usualmente baseada na coleta de dados sobre estrutura, processo e resultado, conforme o modelo criado por Donabedian, na década de 1960.
B) Entre os indicadores utilizados na análise de impacto organizacional dos serviços de saúde, citam-se como exemplos: recursos financeiros, custos e despesas; e estoque (material de consumo, medicamentos, vacinas e equipamentos médicos).
C) Cita-se como exemplo de indicadores hospitalares de processo: índice de intervalo de substituição representado pela porcentagem de desocupação multiplicada pela média de permanência em dias, divididas pela porcentagem de ocupação.
D) Citam-se como exemplo de indicadores utilizados na avaliação de resultados: morbidade ambulatorial com distribuição dos atendimentos ambulatoriais por causa, idade, sexo, custos; vigilância à saúde/vigilância epidemiológica e sanitária: incidência e prevalência de doenças de notificação compulsória.
E) A Organização Mundial da Saúde estabelece alguns indicadores que permitem conhecer aspectos da situação de saúde da população e das práticas em saúde, entre eles: indicadores sociais e econômicos; indicadores da cobertura da Atenção Primária.

QUESTÃO 09 – As imunodeficiências primárias constituem um grupo de doenças heterogêneas que afetam primariamente a função do sistema imunológico. Mais recentemente, esse grupo de doenças tem sido denominado como Erros Inatos da Imunidade (EII). A principal manifestação dos EII são:

A) Alergias.
B) Linfomas.
C) Leucemias.
D) Infecções.
E) Anemias.

QUESTÃO 10 – A respeito dos distúrbios do sódio, assinale a alternativa correta.

A) A principal consequência da hipernatremia aguda por infusão de solução salina é o edema de membros inferiores.
B) O tratamento da hiponatremia deve considerar a hipocalemia, pois a reposição de potássio desloca o sódio do compartimento extracelular para o intracelular.
C) O principal local acometido pela desmielinização osmótica é o cerebelo.
D) O sódio sérico, em caso de hiponatremia aguda, deve ser rapidamente elevado, mais do que 5 mEq/L/h, totalizando ao menos 20 mEq em 24h.
E) Em casos crônicos, a hiponatremia leve está associada a distúrbios cognitivos, distúrbios de marcha, risco de queda e fraturas.

QUESTÃO 11 – Assinale a alternativa que apresenta um princípio fundamental corretamente descrito de acordo com o Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018.

A) O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de relação particular de confiança e executados com diligência, competência e prudência.
B) É direito do médico requerer desagravo ao Conselho Regional de Medicina quando atingido no exercício de sua profissão.
C) É vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
D) É vedado ao médico deixar de atestar óbito de paciente ao qual vinha prestando assistência, exceto quando houver indícios de morte violenta.
E) O médico portador de doença incapacitante para o exercício profissional, apurada pelo Conselho Regional de Medicina em procedimento administrativo com perícia médica, terá seu registro suspenso enquanto perdurar sua incapacidade.

QUESTÃO 12 – A respeito do exame de urina de rotina, analise os resultados da análise física ou macroscópica da urina e suas possíveis alterações de cor, conforme a presença e a concentração de pigmentos, agentes químicos, produtos do metabolismo ou distúrbios endógenos, e assinale a alternativa que indica correspondência INCORRETA entre a cor apresentada e o respectivo fator.

A) Cinza – furazolidona.
B) Laranja – fenazopiridinas.
C) Incolor – diabetes insípido.
D) Azul – ácido homogentísico.
E) Preta – melanina.

QUESTÃO 13 – A respeito da Ética Médica e da Bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

A) O Código de Ética Médica, no capítulo destinado ao Ensino e Pesquisa Médica, estabelece que é vedado ao médico deixar de obter do paciente ou de seu representante legal o termo de consentimento livre e esclarecido para a realização de pesquisa envolvendo seres humanos, após as devidas explicações sobre a natureza e as consequências da pesquisa.
B) No campo da Bioética, o consentimento informado é uma condição indispensável da relação médico-paciente e da pesquisa com seres humanos e se trata de uma decisão voluntária, realizada por uma pessoa autônoma e capaz, tomada após um processo informativo e deliberativo, visando à aceitação de um tratamento específico ou experimentação, sabendo da natureza deste, das suas consequências e dos seus riscos.
C) No campo da Bioética, o consentimento informado obtido de forma correta legitima e fundamenta o ato médico ou de pesquisa como justo e eticamente correto.
D) No campo da Bioética, o respeito decorrente da dignidade e a autonomia são propriedades que caracterizam o consentimento informado.
E) No campo da Bioética, é evidente que o médico e os demais profissionais da saúde devem exercer o princípio da benevolência de modo absoluto, pois isso não aniquila a manifestação da vontade, dos desejos e dos sentimentos do paciente.

QUESTÃO 14 – A respeito de epidemiologia em saúde e da abordagem de exames diagnósticos, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Na prática diagnóstica, podem ser utilizadas quatro estratégias, segundo Sackett *et al.* (1991): o reconhecimento padrão, a técnica da arborização ou do fluxograma, a técnica da exaustão e a técnica hipotético-dedutiva.
B) As técnicas de raciocínio clínico, segundo Kassirer (1989), incluem o raciocínio probabilístico ou bayesiano, o raciocínio causal e o raciocínio determinístico ou categórico.
C) O nomograma proposto por Fagan fornece diretamente, a partir da probabilidade pré-teste (incidência) da doença na população estudada, a probabilidade pós-teste, de acordo com as razões de verossimilhança.
D) Entre outras ferramentas, a epidemiologia clínica utiliza para o processo diagnóstico a sensibilidade, a especificidade, a curva ROC (*Receiver-operating Characteristic*), os valores preditivos de um teste, a prevalência e as razões de probabilidades.
E) A curva ROC compara sensibilidade e especificidade, além da taxa de falsos-positivos e de verdadeiros-positivos em múltiplos pontos de corte, e os testes de bom poder discriminatório se concentram no campo superior esquerdo dessa curva.


QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa que apresenta INCORRETAMENTE a associação do achado clínico com sua respectiva doença.

A) Edema pré-tibial com cacifo macio – mixedema.
B) Hirsutismo – hipertireoidismo.
C) Língua fissurada – acromegalia.
D) Sinal de Schamroth – Doença de Crohn.
E) Asteríxis – encefalopatia urêmica.

QUESTÃO 16 – Qual exame, entre os abaixo citados, NÃO faz parte dos exames de rastreamento de rotina no pré-natal segundo o Ministério da Saúde?

A) VDRL.
B) Toxoplasmose IgG e IgM.
C) HTLV I/II.
D) Glicemia de jejum.
E) Citomegalovírus IgG e IgM.

QUESTÃO 17 – Primigesta, 30 anos, 38 semanas de gestação, hipertensa crônica em uso de metildopa 1,5 g/dia, encontra-se em trabalho de parto com 6 cm de dilatação, bolsa rota com líquido amniótico claro e feto cefálico no plano zero de De Lee. Realizada cardiotocografia, cujo traçado está abaixo:



Nesse contexto, é correto afirmar que se encontra na cardiotocografia:

A) DIP I.
B) DIP II.
C) DIP III.
D) Acelerações transitórias.
E) Taquicardia fetal.

QUESTÃO 18 – O sinal do *sludge* do líquido amniótico à ultrassonografia está associado ao aumento do risco de:

A) Infecção intra-amniótica.
B) Pré-eclâmpsia.
C) Parto pré-termo.
D) Descolamento prematuro de placenta.
E) Rupreme.

QUESTÃO 19 – Em mulheres com antecedente de óbito fetal, com o intuito de evitar a repetição desse desfecho, é recomendado, EXCETO:

A) Pesquisar trombofilia adquirida no intervalo interpartal.
B) Orientar mobilograma a partir de 28 semanas.
C) Indicar indução do parto com 36 semanas de gestação.
D) Solicitar, no intervalo interpartal, Coombs indireto, mesmo nas pacientes Rh positivo, para afastar aloimunização por outros antígenos.
E) Realizar monitorização da vitalidade fetal intensiva a partir de 32 semanas de gestação.

QUESTÃO 20 – Entre os parâmetros biométricos utilizados na ultrassonografia obstétrica, qual apresenta maior sensibilidade no diagnóstico de restrição do crescimento fetal quando utilizado isoladamente?

A) Circunferência cefálica.
B) Circunferência abdominal.
C) Diâmetro biparietal.
D) Comprimento do fêmur.
E) Comprimento do úmero.

QUESTÃO 21 – Secundigesta, 22 semanas de gestação, realizou medida do colo uterino por via transvaginal por ocasião da ultrassonografia morfológica de 2º trimestre, cujo comprimento do colo foi de 18 mm. Está em uso de progesterona natural micronizada 200 mg/dia por via vaginal desde a 14ª semana de gestação devido a parto pré-termo espontâneo com 32 semanas em gestação prévia. Nesse caso, qual é a melhor conduta?

A) Manter o uso da progesterona e fazer repouso absoluto.
B) Aumentar a dose de progesterona para 800 mg/dia.
C) Apenas manter o uso da progesterona.
D) Realizar cerclagem do colo uterino neste momento e manter o uso da progesterona.
E) Substituir o uso da progesterona pela cerclagem do colo uterino.

QUESTÃO 22 – Analise as seguintes asserções e a relação proposta entre elas:

I. O diagnóstico antenatal da Vasa Prévia (VP) é imperativo.

PORQUE

II. O parto cesáreo eletivo tem o potencial de evitar quase a totalidade da mortalidade perinatal causada pela VP.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa da I.
B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa da I.
C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.
D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.
E) As asserções I e II são proposições falsas.

QUESTÃO 23 – Primigesta, 40 anos, 35 semanas de gestação, encontra-se internada por pré-eclâmpsia. Apresenta cefaleia e crise hipertensiva, com pressão arterial de 165/110 mmHg há 15 minutos. Ausência de contrações e perdas vaginais. Batimentos cardiofetais de 145 bpm. Qual é a conduta imediata adequada?

A) Hidralazina intravenosa.
B) Nifedipina via oral e sulfato de magnésio intravenoso.
C) Sulfato de magnésio intravenoso.
D) Nifedipina via oral.
E) Betametasona via intramuscular.

QUESTÃO 24 – Na restrição de crescimento fetal tardia, a avaliação da perfusão placentária e da resposta adaptativa do feto frente a hipoxemia é melhor determinada por qual índice da dopplervelocimetria?

A) IP das artérias umbilicais.
B) IP do ducto venoso.
C) Relação cérebro-placentária.
D) IP das artérias uterinas.
E) IP da veia umbilical.

QUESTÃO 25 – No aborto retido de gestação com 8 semanas de evolução, a expulsão do conteúdo uterino (aborto farmacológico) com o uso isolado de misoprostol deverá ser em dose única de:

A) 200 µg.
B) 400 µg.
C) 600 µg.
D) 800 µg.
E) 1.000 µg.

QUESTÃO 26 – Em uma gestação gemelar monocoriônica monoamniótica não complicada, qual é a idade gestacional recomendada para o parto?

A) 38 semanas.
B) 36 semanas.
C) 35 a 37 semanas.
D) 34 a 36 semanas.
E) 32 a 34 semanas.

QUESTÃO 27 – Primigesta, 35 semanas de gestação, calculada por ultrassonografia de 8 semanas, de risco habitual, procura a maternidade por perda vaginal líquida há 2 horas. Nega dor ou sangramento vaginal. Ao exame, pressão arterial: 100/60 mmHg, temperatura axilar: 36,2 °C, ausculta fetal: 145 bpm, sem dinâmica uterina, exame especular: saída de líquido amniótico claro, toque vaginal: colo grosso, posterior e fechado. Cardiotocografia: categoria 1. Qual é a conduta adequada?

A) Realizar corticoterapia e conduta expectante.
B) Iniciar penicilina ou ampicilina e indução do parto com misoprostol.
C) Realizar corticoterapia, administrar sulfato de magnésio e conduta expectante.
D) Iniciar penicilina ou ampicilina e indução do parto com ocitocina.
E) Realizar indução do parto com misoprostol.

QUESTÃO 28 – São complicações comuns no descolamento prematuro de placenta com repercussão materno-fetal:

A) Hemorragia puerperal por atonia uterina e coagulopatia.
B) Coagulopatia e inversão uterina.
C) Hemorragia puerperal por atonia uterina e ruptura uterina.
D) Ruptura uterina e coagulopatia.
E) Síndrome de Sheehan e inversão uterina.

QUESTÃO 29 – Qual é o principal risco na presença de trombofilia hereditária na gestação?

A) Evento tromboembólico.
B) Abortamento de repetição.
C) Morte fetal no 3º trimestre.
D) Descolamento prematuro de placenta.
E) Restrição de crescimento fetal.

QUESTÃO 30 – A produção de estrogênio nas células da granulosa é mediada pela ação do _____, que induz a atividade da enzima _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) LH – aromatase
B) FSH – aromatase
C) LH – cicloxigenase
D) FSH – cicloxigenase
E) GnRH – 5α-redutase

QUESTÃO 31 – Mulher, 25 anos, procura emergência por dor forte em baixo ventre, mais localizada em fossa ilíaca direita, há 3 horas. Tem dificuldade para deambular pela dor e vômitos. Tem ciclos menstruais regulares com intervalo de 28 dias, sendo a última menstruação há 13 dias. Faz uso de camisinha como método contraceptivo. Ao exame, pressão arterial de 100/60 mmHg, frequência cardíaca de 90 bpm, temperatura axilar de 36,5 °C, dor forte à palpação em baixo ventre com dor à descompressão brusca à direita. Realizada ultrassonografia transvaginal que evidencia grande quantidade de líquido livre (sangue?) e cisto complexo em ovário direito com vascularização ao Doppler em sua periferia. Beta HCG sérico negativo. Qual é a hipótese diagnóstica?

A) Torção anexial.
B) Apendicite.
C) Cisto de corpo lúteo hemorrágico.
D) Gravidez ectópica.
E) Abscesso tubo-ovariano.

QUESTÃO 32 – É a causa mais comum de leucorreia na mulher, sendo comumente assintomática, e é caracterizada por uma substituição de lactobacilos por anaeróbios na microbiota vaginal. O trecho refere-se à:

A) Tricomoníase.
B) Vaginose bacteriana.
C) Vaginose citolítica.
D) Vaginite inflamatória descamativa.
E) Vaginite atrófica.

QUESTÃO 33 – São achados laboratoriais comuns em paciente com síndrome dos ovários policísticos, EXCETO:

A) Androgênios elevados.
B) Hiperinsulinemia basal.
C) Dislipidemia.
D) Diminuição da secreção de LH.
E) Intolerância à glicose.

QUESTÃO 34 – São efeitos benéficos do uso do anticoncepcional combinado oral, EXCETO:

A) Melhora da oleosidade da pele.
B) Programação do sangramento por deprivação hormonal.
C) Melhora do hipoestrogenismo de atletas de alta performance.
D) Tratamento de sangramentos uterinos não estruturais.
E) Prevenção do desenvolvimento de endometriose.

QUESTÃO 35 – Qual é a terapêutica hormonal considerada mais efetiva no controle do sangramento uterino anormal de causa não estrutural?

A) Anticoncepcional combinado oral.
B) Sistema intrauterino liberador de levonorgestrel.
C) Progestogênio isolado oral em altas doses.
D) Implante subcutâneo de etonogestrel.
E) Progestagênio injetável.

QUESTÃO 36 – Em relação ao uso de Terapia Hormonal (TH) no climatério e ao risco cardiovascular, analise as assertivas abaixo:

I. Há evidências de benefícios cardiovasculares quando a TH é iniciada na transição menopáusica ou nos primeiros anos de pós-menopausa em mulheres saudáveis.
II. Não há indicação do emprego da TH em mulheres saudáveis e assintomáticas com a única finalidade de reduzir o risco de doença cardiovascular no climatério.
III. Não há estudos que comprovem a segurança cardiovascular do emprego de testosterona associada à TH convencional do climatério.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 37 – No exame imuno-histoquímico de um câncer de mama, são considerados fatores prognósticos desfavoráveis:

I. Receptores hormonais negativos.
II. HER-2 positivo.
III. Ki-67 elevado.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 38 – A amenorreia secundária deve ser investigada quando a menstruação não ocorrer por _____ meses ou quando ocorrerem menos de _____ menstruações ao longo de um ano.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) seis – oito
B) seis – nove
C) três – nove
D) três – oito
E) cinco – dez

QUESTÃO 39 – Na mulher, o HPV pode afetar diferentes epitélios, causando lesões pré-invasoras e câncer como os citados abaixo, EXCETO:

A) Colo do útero.
B) Vagina.
C) Vulva.
D) Endométrio.
E) Orofaringe.

QUESTÃO 40 – Qual achado ultrassonográfico isolado constitui indicação cirúrgica em tumores anexiais em mulheres na pré-menopausa pelo risco de malignidade?

A) Massa superior a 10 cm de diâmetro.
B) Cisto anecoico e homogêneo.
C) Cisto com conteúdo de aspecto heterogêneo linear.
D) Cisto com conteúdo homogêneo com pontilhado fino em vidro fosco.
E) Massa tubular com septações incompletas.